

PAKKAUSSELOSTE

Panadol Zapp® 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Panadol Zappia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieydy kolmen päivän jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Panadol Zapp on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Panadol Zappia
3. Miten Panadol Zappia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Panadol Zappin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ PANADOL ZAPP ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Panadol Zapp on särky- ja kuumelääke, joka nopeasti lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol Zapp tableteilla kivun lievittyminen alkaa nopeammin kuin tavallisia parasetamolitabletteja käytettäessä.

Panadol Zapp tabletteja käytetään tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PANADOL ZAPPIA

Älä käytä Panadol Zappia

- jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai Panadol Zappin jollekin muulle aineelle.
- jos sinulla on maksasairaus tai alkoholiongelmia, Panadol valmisteita ei saa käyttää ilman lääkärin ohjeita.

Ole erityisen varovainen Panadol Zappin suhteen

- jos sinulla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai maksasairaus.
- jos noudatat niukasti natriumia sisältävää ruokavaliota (esim. verenpainetauti sairastavat henkilöt), on hyvä muistaa, että 1 tabletti sisältää 173 mg natriumia.
- muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti.
- Panadol Zapp tabletit on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Panadol Zappin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Panadol Zapp tabletit voidaan ottaa joko tyhjiin vatsaan tai ruokailun yhteydessä.

Ruokailu ei vaikuta kivun lievittymisen alkamisajankohtaan.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Panadol Zapp tabletteja voi käyttää tilapäisesti ohjeen mukaisina annoksina raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Zapp tabletit eivät aiheuta uneliaisuutta, joten voit ajaa autoa ja käyttää koneita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos käytät metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenhennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol lääkityksestä lääkärin kanssa.

Älä käytä muita parasetamolia sisältäviä valmisteita samanaikaisesti.

Tärkeää tietoa Panadol Zapp tabletin sisältämistä aineista

Tabletit sisältävät pienen määrän kaliumsorbaattia, joka voi herkille henkilöille aiheuttaa ihottumaa.

3. MITEN PANADOL ZAPPIA KÄYTETÄÄN

Käytä Panadol Zapp tabletteja juuri sen verran kuin annostusohjeessa sanotaan. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille (yli 40 kg) on 1-2 tablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Alle 12-vuotiaille lapsille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Kipu lievittyy nopeasti sekä yhden että kahden tabletin kerta-annoksen jälkeen.

Älä ylitä annosteluohjetta.

Jos käytät enemmän Panadol Zappia kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksissa ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Jos unohdat ottaa Panadol Zappia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Panadol Zapp tablettikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysoireet parasetamolille, ihottumat, veren solujen väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat olleet yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille.

Runsas alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

PIL OTC

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. PANADOL ZAPPIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä valmistetta, jos pakkauksen folio on rikki valmistetta ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Panadol Zapp sisältää

- Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on yhdessä tablettissa 500 mg.
- Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, kaliumsorbaatti, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste sisältää titaanidioksidia (E171), polydekstroosia, hypromelloosia, glyserolitriasettaattia, makrogoli 8000 ja karnaubavahaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol Zapp tabletti on valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on merkintä ”P” tabletin toisella puolella.

8, 10, 16, 20 ja 30 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Tanska

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Dungarvan, Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Oy, Consumer Healthcare

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 30 30 30

Pakkausseloste on tarkistettu 10.9.2010

BIPACKSEDEL

Panadol Zapp® 500 mg filmdragerad tablett paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Panadol Zapp måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom tre dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Panadol Zapp är och vad det används för
2. Innan du använder Panadol Zapp
3. Hur du använder Panadol Zapp
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Panadol Zapp
6. Övriga upplysningar

1. VAD PANADOL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panadol Zapp är ett läkemedel mot feber och värk med snabb smärtstillande och febernedsättande effekt. Smärtlindringen börjar snabbare vid användning av Panadol Zapp tabletter än med vanliga paracetamol tabletter.

Panadol Zapp tabletter används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig feber och värk. Dessa tillstånd kan utgöras av bl.a. nerv- och muskelvärk, huvudvärk, förkylning, influensa, tandvärk och menstruationssmärter.

Enligt läkares föreskrift kan Panadol Zapp användas även för behandling av andra smärttillstånd.

2. INNAN DU ANVÄNDER PANADOL ZAPP

Använd inte Panadol Zapp

- om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panadol Zapp.
- om du har en leversjukdom eller alkoholproblem skall du inte använda Panadol preparat utan läkares föreskrift.

Var särskilt försiktig med Panadol Zapp

- om du har en hjärt-, njur- eller leversjukdom.
- om du har ordinerats en kost med låg natriumhalt (t ex vid högt blodtryck) skall tänka på att 1 tablett innehåller 173 mg natrium.
- inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.
- Panadol Zapp tabletter är avsedda för tillfälligt bruk.

Användning av Panadol Zapp med mat och dryck

Panadol Zapp tabletter kan intas både på fastande mage och till maten.

Mat inverkar inte på hur snabbt smärtlindringen börjar.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Vid dosering enligt bruksanvisning kan Panadol Zapp tabletter användas tillfälligt under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Zapp orsakar inte dåsigheit så du kan köra bil eller använda maskiner.

Användning av andra läkemedel

Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) och antiepileptika rådgör med läkare om samtidigt medicinering med Panadol Zapp.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Viktig information om något innehållsämne i Panadol Zapp

Tabletterna innehåller en liten mängd kaliumsorbat som kan framkalla hudutslag hos känsliga personer.

3. HUR DU ANVÄNDER PANADOL ZAPP

Använd alltid Panadol Zapp enligt anvisningar i förpackningen.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos till vuxna och barn över 12 år (över 40 kg) ges 1-2 tabletter högst 3 gånger dagligen.

Till barn under 12 år och för kontinuerlig användning endast enligt läkares föreskrift.

Den smärtstillande effekten uppnås snabbt vid intag av såväl 1 tablett som 2 tabletter intagna samtidigt.

Doseringsanvisningen får inte överskridas.

Om du har använt för stor mängd av Panadol Zapp

Vid överdosering bör en läkare, ett sjukhus eller Giftinformationscentralen omedelbart kontaktas.

Om du har glömt att ta Panadol Zapp

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panadol Zapp tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Paracetamol preparat tolereras i allmänhet väl. Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 användare) biverkningar är kraftiga reaktioner på grund av överkänslighet för paracetamol, eksem, minskande antal blodkroppar eller nedsatt leverfunktion. Sammandragning av lufttrören kan uppträda hos personer med känslighet för acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska värkmedicin.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV PANADOL ZAPP

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges i förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte preparatet om förpackningens folie är trasig vid inköpstillfället.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 500 mg i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, majstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, kaliumsorbat, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. Filmöverdraget innehåller: titandioxid (E171), polydextrose, hypromellos, glyceroltriacetat, makrogol 8000 och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol Zapp tablett är en vit, oval filmdragerad tablett med märkningen ”P” på andra sidan.

8, 10, 16, 20 ja 30 tabletter i genomtrycksförpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Dungarvan, Irland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare

PB 24

02231 Esbo

Tel 010 30 30 30

Denna bipacksedel godkändes senaste 10.9.2010