

PAKKAUSSELOSTE

Huomattavaa: Lääkäri on voinut määrätä valmisteen eri käyttötarkoitukseen ja/tai erilaisella annostusohjeella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on mainittu. Lääkärin antamia sekä apteekin ohjelipussa mainittuja ohjeita tulee aina noudattaa.

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio

MITÄ VALMISTE SISÄLTÄÄ?

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 24 mg/ml. Lisäksi valmiste sisältää apuaineina hydrogenoitua glukoosisiirappia, kiteytyvää 70 %:sta sorbitoliliuosta, sorbitolia, ksantaanikumia, omenahappoa, vedetöntä sitruunahappoa, mansikka-aromia, natriumetyyli- (E 215), natriummetyyli- (E 219) ja natriumpropyyli parahydroksibentsoattia (E 217) sekä puhdistettua vettä.

MITEN VALMISTE VAIKUTTAA?

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

MYYNTELUVAN HALTIJA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Tanska

VALMISTAJA

Glaxo Wellcome Production
Herouville
Ranska

SUOMESSA LISÄTIETOJA ANTAA:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PL 24
02231 Espoo
puh. 010 303030

Tarvittaessa voit aina kysyä lisätietoja myös apteekista tai lääkäriltä.

MIHIN VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

Panadol oraalisuspensiota käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kiputilat, vilustuminen, influenssa ja rokotusten jälkeiset reaktiot.

MILLOIN VALMISTETTA EI TULE KÄYTTÄÄ?

Henkilöiden, jotka mahdollisesti ovat allergisia parasetamolille tai mille tahansa muulle valmisteeseen sisällyttämälle ainesosalle, ei tule käyttää Panadol oraalisuspensiota.

Jos lapsella on maksasairaus, tulee Panadol valmisteita käyttää vain lääkärin ohjeen mukaan.

Valmiste sisältää makeutusaineena sorbitolia (114,3 mg/ml). Siksi se ei sovi lapsille, jotka sairastavat harvinaista perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia (fruktoosinsietokyvyttömyys).

Herkkävatsaisille sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT:

Kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsi kärsii päänsärystä tai lihassärystä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee. Muita särkylääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti.

MITÄ VALMISTETTA KÄYTETTÄESSÄ TULEE VÄLTÄÄ?

Mikäli samanaikaisesti käytetään muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä, tulee Panadol-lääkityksestä neuvotella lääkärin kanssa.

ANNOSTUS

Parasetamolinn annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg/painokilo, korkeintaan 3 kertaa päivässä:

| | |
|----------|--------------|
| 3-4 kg | 1-2 ml |
| 5-8 kg | 3-5 ml |
| 9-12 kg | 5,5-7,5 ml |
| 13-16 kg | 8-10 ml |
| 17-20 kg | 10,5-12,5 ml |
| 21-24 kg | 13-15 ml |
| 25-30 kg | 15,5-18,5 ml |

Alle 3 kuukauden ikäisille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Ravistetaan ennen käyttöä. Pullossa on turvakorkki, joka avataan painamalla korkkia alas ja kääntämällä samanaikaisesti vastapäivään. Pullo suljetaan huolellisesti käytön jälkeen.

Suositteluja annoksia ei saa ylittää.

YLIANNOSTUS

Yliannostustapauksissa tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Panadol saattaa kuitenkin harvoissa tapauksissa aiheuttaa allergisia oireita ja ihottumaa. Tällöin on hoito keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä myös silloin, jos havaitaan pakkausosteissa mainitsemattomia sivuvaikutuksia.

KUINKA VALMISTE SÄILYTETÄÄN?

Panadol oraalisuspensio säilytetään huoneenlämmössä (+15 - +25 °C).

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Älä käytä valmistetta, jos pullonkorkki on rikki tai auki valmistetta ostettaessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Älä ylitä pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää.

21.3.2003