

PAKKAUSSELOSTE

Huomattavaa: Lääkäri on voinut määrätä valmisteen eri käyttötarkoitukseen ja/tai erilaisella annostusohjeella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on mainittu. Lääkärin antamia sekä apteekin ohjelipussa mainittuja ohjeita tulee aina noudattaa.

Panadol 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

MITÄ VALMISTE SISÄLTÄÄ?

Panadol 500 mg tabletti sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 500 mg. Lisäksi valmiste sisältää apuaineina maissitärkkelystä, esigelatinoitua tärkkelystä, povidonia, kaliumsorbaattia, talkkia, steariinihappoa, hypromelloosia sekä glyseroltriasetaattia. Tabletin merkintämuste sisältää etanolia, propyleeniglykolia, shellakkaa, briljanttisinistä (E133), natriumlaktaattia ja dimetikoniemulsiota.

MITEN VALMISTE VAIKUTTAA?

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

MYYNTILUVAN HALTIJA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Tanska

VALMISTAJA

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.
Dungarvan
Irlanti

Tai

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,
Factory site Herrenberg
Saksa

SUOMESSA LISÄTIETOJA ANTAA:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PL 24
02231 Espoo
puh. 010 303030

Tarvittaessa voit aina kysyä lisätietoja myös apteekista tai lääkäriltä.

MIHIN VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

Panadol tabletteja käytetään tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut. Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

MILLOIN VALMISTETTA EI TULE KÄYTTÄÄ?

Henkilöiden, jotka mahdollisesti ovat allergisia parasetamolille tai mille tahansa muulle valmisteen sisältämälle ainesosalle, ei tule käyttää Panadol tabletteja. Jos henkilöllä on maksasairaus tai alkoholiongelmia, ei Panadol valmisteita tule käyttää ilman lääkärin ohjeita.

ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ TULEE HUOMIOIDA SEURAAVAT ASIAT:

Panadol tabletit on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, tulee lääkäriin ottaa yhteyttä. Muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti.

Tabletit sisältävät pienen määrän kaliumsorbaattia, joka voi herkille henkilöille aiheuttaa ihottumaa.

MITÄ VALMISTETTA KÄYTETTÄESSÄ TULEE VÄLTÄÄ?

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, mikäli samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Jos muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä kuten metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidiä sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä tai epilepsialääkkeitä käytetään samanaikaisesti, Panadol-lääkityksestä tulee neuvotella ensin lääkärin kanssa.

RASKAUS JA IMETYS

Panadol tabletteja voi käyttää ohjeen mukaisin annoksin myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

ANNOSTUS

Aikuisille 1-2 tablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Parasetamolin annos lapsille on 15 mg / painokilo korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Lapsille yli 4-vuotiaille:

17 - 25 kg ½ tablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

25 - 32 kg ½ - 1 tablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Yli 32 kg 1 tabletti korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Alle 4-vuotiaille lapsille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Alle 4-vuotiaille suositellaan Panadol peräpuikkoja tai oraalisuspensiota. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.

YLIANNOSTUS

Yliannostustapauksissa tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Panadol tabletit saattavat kuitenkin harvoissa tapauksissa aiheuttaa allergisia oireita ja ihottumaa. Tällöin on hoito keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin. Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä myös silloin, jos havaitaan pakkausselosteessa mainitsemattomia sivuvaikutuksia.

KUINKA VALMISTE SÄILYTETÄÄN?

Panadol tabletit säilytetään huoneenlämmössä (+ 15 - +25 °C). Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Älä käytä valmistetta, mikäli läpipainopakkauksen folio on rikki valmistetta ostettaessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Älä ylitä pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää.

27.6.2003