

PAKKAUSSELOSTE

Huomattavaa: Lääkäri on voinut määrätä valmisteen eri käyttötarkoitukseen ja/tai erilaisella annostusohjeella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on mainittu. Lääkärin antamia sekä apteekin ohjelipussa mainittuja ohjeita tulee aina noudattaa.

Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikot

MITÄ VALMISTE SISÄLTÄÄ?

Panadol 60 mg peräpuikko sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 60 mg.

Panadol 125 mg peräpuikko sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 125 mg.

Panadol 250 mg peräpuikko sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 250 mg.

Lisäksi peräpuikot sisältävät apuaineena koverasvaa.

MITEN VALMISTE VAIKUTTAA?

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

MYYNTILUVAN HALTIJA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tanska

VALMISTAJA

Glaxo Wellcome Production

Herouville

Ranska

SUOMESSA LISÄTIETOJA ANTAA:

GlaxoSmithKline Oy, Consumer Healthcare

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 303030

Tarvittaessa voit aina kysyä lisätietoja myös apteekista tai lääkäriltä.

MIHIN VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

Panadol peräpuikkoja käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kiputilat, vilustuminen, influenssa ja rokotuksen jälkeiset reaktiot.

MILLOIN VALMISTETTA EI TULE KÄYTTÄÄ?

Henkilöiden, jotka mahdollisesti ovat allergisia parasetamolille tai muulle valmisteeseen sisältämälle ainesosalle, ei tule käyttää Panadol peräpuikkoja.

Jos lapsella on maksasairaus, tulee Panadol valmisteita käyttää vain lääkärin ohjeen mukaan.

ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ TULEE HUOMIOIDA SEURAAVAT ASIAT:

Kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsi kärsii päänsärystä tai lihassärystä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee. Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti.

MITÄ VALMISTETTA KÄYTETTÄESSÄ TULEE VÄLTÄÄ?

Mikäli samanaikaisesti käytetään muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä, tulee Panadol-lääkityksestä neuvotella lääkärin kanssa.

ANNOSTUS

Parasetamolin annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg / painokilo korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Panadol peräpuikkoja annostellaan lapsen painon mukaan seuraavasti:

Panadol 60 mg

5-8 kg 1-2 peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Panadol 125 mg

9-12 kg 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä.

13-16 kg 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Panadol 250 mg

17-24 kg 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä.

25-32 kg 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Alle 3 kuukauden ikäisille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Suositteluja annoksia ei saa ylittää.

Peräpuikko laitetaan peräsuoleen. Peräpuikko sulaa helposti käsiteltäessä. Mikäli peräpuikko on pehmennyt, laita se ennen käyttöä hetkeksi jääkaappiin.

YLIANNOSTUS

Yliannostustapauksissa tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Peräpuikkojen käyttö saattaa aiheuttaa peräaukon kutinaa. Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä, mutta saattavat kuitenkin harvoissa tapauksissa aiheuttaa allergisia oireita ja ihottumaa. Tällöin on hoito keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin.

Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä myös silloin, jos havaitaan pakkausselosteessa mainitsemattomia sivuvaikutuksia.

KUINKA VALMISTE SÄILYTETÄÄN?

Panadol peräpuikot säilytetään huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C).

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Älä käytä valmistetta, mikäli peräpuikkoliuska on rikki valmistetta ostettaessa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Älä ylitä pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää.

21.3.2003

BIPACKSEDEL