

## PAKKAUSSELOSTE

**Huomattavaa: Lääkäri on voinut määrätä valmisteen eri käyttötarkoitukseen ja/tai erilaisella annostusohjeella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on mainittu. Lääkärin antamia sekä apteekin ohjelipussa mainittuja ohjeita tulee aina noudattaa.**

## Panadol Pore 500 mg poretabletit

### MITÄ VALMISTE SISÄLTÄÄ?

*Panadol Pore 500 mg poretabletti* sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia 500 mg. Lisäksi valmiste sisältää apuaineina natriumvetykarbonaattia, sorbitolia, sakkariininatiumia, natriumlauryylisulfaattia, vedetöntä sitruunahappoa, vedetöntä natriumkarbonaattia, povidonia, dimetikonua ja puhdistettua vettä.

### MITEN VALMISTE VAIKUTTAA?

Panadol Pore on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

### MYYNTELUVAN HALTIJA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  
Tanska

### VALMISTAJA

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.  
Dungarvan  
Irlanti

Tai

Famar  
Attiki  
Kreikka

### SUOMESSA LISÄTIETOJA ANTAA:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare  
PL 24  
02231 Espoo  
puh. 010 303030

**Tarvittaessa voit aina kysyä lisätietoja myös apteekista tai lääkäriltä.**

### MIHIN VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

Panadol Pore poretabletteja käytetään tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

**MILLOIN VALMISTETTA EI TULE KÄYTTÄÄ?**

Henkilöiden, jotka mahdollisesti ovat allergisia parasetamolille tai mille tahansa muulle valmisteen sisältämälle ainesosalle, ei tule käyttää Panadol Pore poretabletteja.

Jos henkilöllä on maksasairaus tai alkoholiongelmia, ei Panadol valmisteita tule käyttää ilman lääkärin ohjeita.

**ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ TULEE HUOMIOIDA SEURAAVAT ASIAT:**

Panadol Pore on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, tulee lääkäriin ottaa yhteyttä. Muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti.

Henkilöiden, jotka noudattavat vähänatriumista ruokavaliota (esim. verenpainepotilaat), tulee ottaa huomioon, että 1 poretabletti sisältää 427 mg natriumia.

**MITÄ VALMISTETTA KÄYTETTÄESSÄ TULEE VÄLTÄÄ?**

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, mikäli samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Jos muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä kuten metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidiä sisältäviä valmisteita, verenhennuslääkkeitä tai epilepsialääkkeitä käytetään samanaikaisesti, Panadol-lääkityksestä tulee neuvotella ensin lääkärin kanssa.

**RASKAUS JA IMETYS**

Panadol Pore poretabletteja voi käyttää ohjeen mukaisin annoksina myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

**ANNOSTUS**

Aikuisille 1-2 poretablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Lapsille yli 4-vuotiaille parasetamolin annos lapsille on 15 mg / painokilo korkeintaan 3 kertaa päivässä.

17 - 25 kg ½ poretablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

25 - 32 kg ½ - 1 poretablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Yli 32 kg 1 poretabletti korkeintaan 3 kertaa päivässä.

Poretabletti liuotetaan huolellisesti n. 1 dl:aan nestettä, niin että se on kokonaan liuennut. Liuos on kirkas, maku neutraali.

Alle 4-vuotiaille lapsille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Alle 4-vuotiaille suositellaan Panadol peräpuikkoja tai oraalisuspensiota. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.

**YLIANNOSTUS**

Yliannostustapauksissa tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

**HAITTAVAIKUTUKSET**

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Panadol Pore poretabletit saattavat kuitenkin harvoissa tapauksissa aiheuttaa allergisia oireita ja ihottumaa. Tällöin on hoito keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin. Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä myös silloin, jos havaitaan pakkausselosteessa mainitsemattomia sivuvaikutuksia.

**KUINKA VALMISTE SÄILYTETÄÄN?**

Panadol Pore poretabletit säilytetään huoneenlämmössä (+ 15 - +25 °C).

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Älä käytä valmistetta, jos repäisy-pakkauksen folio on rikki valmistetta ostettaessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Älä ylitä pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää.

7.2.2003